



10 février 2022 – Rappel concernant les recommandations pour la prévention et le traitement des patients immunodéprimés sévères

En cette période de circulation toujours intense du variant Omicron, si vous êtes dialysés, si vous avez reçu une greffe rénale, si vous recevez un traitement immunosuppresseur :

- **Vous êtes non répondeur au vaccin**
Après un schéma vaccinal complet, y compris une 4ème dose et 1 ou 2 doses de rappel (= 5ème ou 6ème dose de vaccin), si la sérologie mesurant vos anticorps anti-S montre que vous n'avez pas d'anticorps ou que leur taux reste trop bas (< 264 BAU/ml) pour assurer une protection efficace → **vous êtes éligibles à un traitement préventif par anticorps monoclonaux (Evusheld®). Contactez votre néphrologue ou votre équipe de transplantation pour obtenir un rendez-vous pour réaliser l'injection sans délai ; c'est maintenant que vous en avez besoin !**
- **Si vous avez des symptômes du COVID, contactez sans attendre votre néphrologue ou votre équipe de transplantation** pour recevoir le plus vite possible un **traitement curatif** afin d'éviter de faire une forme grave de la maladie. Votre médecin décidera en fonction de votre bénéfice/risque individuel d'initier soit une injection d'anticorps monoclonal sotrovimab (**Xevudy®**), soit un traitement antiviral oral par **Paxlovid®**.
- **Dans tous les cas, continuez à respecter scrupuleusement les gestes barrières et le port du masque FFP2.**